

## がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	JALSG-ALL202-U Maintenance therapy 1-A (weeks 20-25) for CNS-invasion-negative cases
診療科名	血液腫瘍内科
診療科責任者名	末永 孝生
適応がん種	成人急性リンパ性白血病
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	ALL-038
登録日・更新日	2019年6月25日
削除日	
出典	Blood Cancer Journal (2014) 4, e252
入力者	高松 宏行

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名) 希釈液	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
No.1	メソトレキセート (メソトレキセート注射剤) 生理食塩液	200mg, 1000mg 100mL	150 mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	30分	day1, 15, 29
No.2	メルカプトプリン水和物散 (ロイケリン散)	10%	50 mg/m <sup>2</sup> *1	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(経口)		day1-28
No.3	メソトレキセート (メソトレキセート注射剤)	5mg	12 mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他( 髄注 )		day 29
	シタラビン (シタラビン注射液)	40mg	30 mg			
	ソル・コーテフ注射用	100mg	25 mg			
	生理食塩液	20mL	*2			

1コースの期間	42日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能(1日)・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	開始基準 ANC $\geq$ 500/ $\mu$ L PIt $\geq$ 5万/ $\mu$ L 【triple IT】 中止・延期基準 PIt<5万/ $\mu$ L、PT-INR>1.4、APTT>38秒
前投薬	day1, 15, 29 デキサート6.6mg
その他の注意事項	*1 WBC数を2000から3000/ $\mu$ Lに保つように用量を調整する。 *2 原則、総量が5mLになるように調製する。 【triple IT】 併用注意薬 ・ヘパリンNa(6時間以内の併用) ・低分子ヘパリン(12時間以内の併用) ・抗血小板薬 クロピドグレル、チクロピジン、など ・抗凝固薬 アピキサラン、ダビガトラン、ワルファリン など ・内服の併用注意薬の休薬期間は、院内の「凝固系薬術前休薬一覧」に準拠する。 ※アスピリンは併用してもよい ※ヘパリンカルシウム(ヘパリン皮下注)は10000U/dayまでは併用してもよい

記入者	高松 宏行
確認者	成田 健太郎