

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
 プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	ALL202-O Consolidation therapy 2 ArmB
診療科名	血液腫瘍内科
診療科責任者名	末永 孝生
適応がん種	ALL
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	ALL-7
登録日・更新日	2010年1月28日
削除日	
出典	JALSG ALL202
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

No.	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート					投与時間	施行日
				IV	DIV	IVHポート	側管	その他()		
No.1	メソトレキセート	200mg,50mg,5mg	500mg/m ²	IV	DIV	IVHポート	側管	その他()	24時間	Day1,15
	生理食塩液	500mL								
No.2	オンコピン	1mg	1.3mg/m ²	IV	DIV	IVHポート	側管	その他()	10分	Day1,15
	生理食塩液	50mL								
No.3	ロイケリン散		25mg/m ²	IV	DIV	IVHポート	側管	その他(PO)	分1眠前	Day1-21
No.4	:MTX 15mg/body + DEX 4mg/body			IV	DIV	IVHポート	側管	その他(IT)	MTX開始2時間後から終了までの間	Day1,15

1コースの期間	設定なし
投与間隔の短縮規定	短縮可能(日) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	開始基準 ANC 1000/μL WBC 3000/μL Plt 8万/μ
前投薬	デキサメタゾン
その他の注意事項	Consolidation therapy 2コース目 5コース目 VCR : max 2mg MTXは最初の2時間で100mg/m ² を投与し残りの22時間で400mg/m ² を投与する

記入者	安室 修
確認者	山倉 昌之