

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	MEC(低用量)
診療科名	血液腫瘍内科
診療科責任者名	末永孝生
適応がん種	再発・難治の急性骨髄性白血病
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	AML-011
登録日・更新日	2019年6月25日
削除日	
出典	N Engl J Med 1990; 323:871-877
入力者	伊勢崎 竜也

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名) 希釈液	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
No.1	エトポシド (エトポシド点滴静注液) 生理食塩液	100mg 500 mL	80 mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	1時間	day1-5
No.2	シタラピン (シタラピン点滴静注液) 生理食塩液	400,1000 mg 500 mL	100mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	24時間	day1-7
No.3	ミトキサントロン塩酸塩 (ノバントロン注) 生理食塩液	10 mg 100 mL	5mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	30分	day1-3

1コースの期間	*1
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能(1日)・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	【投与開始基準】 好中球数 $\geq 1000 / \mu\text{L}$ 血小板数 $\geq 5万 / \mu\text{L}$
前投薬	アブレピタント+5-HT ₃ 受容体拮抗薬+デキサメタゾン
その他の注意事項	*1 好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復してから1週間後 ・1-2コース実施する ・TLS予防としてラスプリカーゼ、フェブキソスタットの使用を考慮する。 ・高齢、エトポシド未使用、単球系白血病の患者に対して、サルベージ療法として用いる。

記入者	伊勢崎 竜也
確認者	北館 明宏