

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

| | |
|----------|--|
| レジメン名 | HD-AraC day1,2,3 |
| 診療科名 | 血液・腫瘍内科 |
| 診療科責任者名 | 末永 孝生 |
| 適応がん種 | 急性骨髄性白血病 |
| 保険適応外の使用 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |

| がん治療ワーキンググループ使用欄 | |
|------------------|---|
| 登録番号 | AML-017 |
| 登録日・更新日 | 2020年12月21日 登録 |
| 削除日 | |
| 出典 | Blood Adv. 2020 Aug 25; 4(16): 3840-3849. |
| 入力者 | 湯山 聡 |

投与順に記入(抗がん剤のみ)

| | 薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名) | 規格 | 投与量算出式 | 投与経路 | 投与時間 | 施行日 |
|------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|------|--------|
| | 希釈液 | | | | | |
| No.1 | シタラピン (シタラピン点滴静注液) | 400mg, 1g | 3g/m ² /回 | □IV ■DIV ■CVポート □側管 □その他() | 3時間 | day1-3 |
| | 生理食塩液 | 500mL | (12時間毎に投与) | | | |

| | |
|------------|---|
| 1コースの期間 | * |
| 投与間隔の短縮規定 | <input type="checkbox"/> 短縮可能(日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能 |
| 計算後の投与量上限値 | 110% |
| 計算後の投与量下限値 | 50% |

| | |
|----------|--|
| 減量・中止基準 | 【開始基準】 ANC \geq 1,500/mm ³ , Plt \geq 10万/mm ³ |
| 前投薬 | 5-HT3受容体拮抗薬+デキサメタゾン |
| その他の注意事項 | * 好中球数および血小板数が開始基準のカウントに回復してから2週間以内 ・原則、60歳以下の患者を対象とする。 ・3コース実施する。 ・眼症状の予防のために、副腎皮質ホルモン点眼剤(フルオロメロン点眼液0.1%、ベタメタゾン点眼液0.1%等)を使用する。 |

| | |
|-----|-------|
| 記入者 | 湯山 聡 |
| 確認者 | 竹内 正美 |