

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	High-Dose AraC 3g/m <sup>2</sup>
診療科名	血液・腫瘍内科
診療科責任者名	末永孝生
適応がん種	急性骨髄性白血病
保険適応外の使用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	AML-8
登録日・更新日	平成 29 年 2 月 28 日
削除日	
出典	Blood 2005 105:3420-3427
入力者	伊勢崎竜也

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	シタラピン点滴静注液	200mg、400mg、1g	3g/m <sup>2</sup> /回	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	3時間	day1、3、5
	生理食塩液	500mL	(12時間毎に投与)			

1コースの期間	*1
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( )・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	【開始基準】 ANC $\geq$ 1,500/mm <sup>3</sup> 、Plt $\geq$ 10万/mm <sup>3</sup>
前投薬	抗5-HT3制吐剤、デキサメタゾン
その他の注意事項	*1 好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復してから2週間以内 ・3コース実施する ・眼症状の予防のために、副腎皮質ホルモン点眼剤(フルオロメロン点眼液0.1%、ベタメタゾン点眼液0.1%等)を使用する。 ・60歳以下

記入者	伊勢崎竜也
確認者	竹内正美