

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	CDDP+GEM
診療科名	消化器内科
診療科責任者名	平田 信人
適応がん種	胆道がん(肝内胆管がん含む)
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Bil-2
登録日・更新日	2010年1月28日
削除日	
出典	British Journal of Cancer (2009)101,621-627
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート			投与時間	施行日
No.1	シスプラチン	10,50mg	25mg/m ²	IV	DIV	IVHポート 側管 その他()	2時間	Day1,8
	生理食塩液	500mL						
No.2	ジェムザール	200mg,1g	1000mg/m ²	IV	DIV	IVHポート 側管 その他()	30分	Day1,8
	生理食塩液	100mL						

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	短縮可能(日) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	ジェムザール WBC < 2000/mm ³ または Plt < 7万/mm ³ のとき投与延期 シスプラチン BUN 25mg/dL クレアチニン 1.5mg/dLのとき投与不可
前投薬	グラニセトロン3mg, デキサメタゾン
その他の注意事項	シスプラチンの投与前後にそれぞれ1,000~2,000mLの適当な輸液を4時間以上かけて投与する 放射線との同時併用は避ける ジェムザールによる血管痛がある場合5%ブドウ糖への変更が可能

記入者	白鳥 俊康
確認者	平田 信人