

レジメン名	アレムツズマブ
診療科名	血液・腫瘍内科
診療科責任者名	末永孝生
適応がん種	再発又は難治性の慢性リンパ性白血病
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	CLL-005
登録日・更新日	2017年2月28日登録 2023年7月21日改訂
削除日	
出典	J Clin Oncol. 2007 ; 25 : 5616-23
入力者	伊勢崎竜也

投与順に記入(抗がん剤のみ)

初回投与量						
	薬剤名:一般名 (薬剤名・商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	アレムツズマブ (マブキャンパス点滴静注)	30mg	3 mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	2時間以上かけて	連日 *1
	ブドウ糖液5%	100mL				
1段階増量						
No.2	アレムツズマブ (マブキャンパス点滴静注)	30mg	10 mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	2時間以上かけて	連日 *1
	ブドウ糖液5%	100mL				
2段階増量						
No.3	アレムツズマブ (マブキャンパス点滴静注)	30mg	30 mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	2時間以上かけて	週3回隔日
	ブドウ糖液5%	100mL				

1コースの期間	12週 *2
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( ) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	<p>【開始基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANC &gt; 500/mm<sup>3</sup></li> </ul> <p>【中止基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANC &lt; 250/mm<sup>3</sup>、Plt ≤ 2.5万/mm<sup>3</sup> 又はベースラインから50%以上減少(2.5万/mm<sup>3</sup>未満で開始した場合)</li> </ul> <p>【再開基準】</p>
	<p>前投薬</p> <p>抗ヒスタミン剤+アセトアミノフェン±ヒドロコルチゾン</p>
その他の注意事項	<p>*1 1日1回3mg及び1日1回10mgの連日点滴静注において、Grade 3以上のinfusion reactionが認められない場合、1日1回3mgでは1日1回10mgの連日点滴静注に、1日1回10mgでは1日1回30mgの週3回隔日点滴静注に、それぞれ増量することができる。</p> <p>*2 投与開始から12週間までの投与とする。</p> <p>B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者(HBs抗原陰性、かつHBe抗体又はHBs抗体陽性)において、B型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎があらわれるおそれがある。肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど患者の状態を十分に観察すること。</p>

記入者	伊勢崎竜也
確認者	竹内正美