

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

| | |
|----------|--|
| レジメン名 | ブレンツキシマブ ベドチン(CTCL) |
| 診療科名 | 血液・腫瘍内科 |
| 診療科責任者名 | 末永 孝生 |
| 適応がん種 | 再発または難治性のCD30陽性の皮膚T細胞リンパ腫 |
| 保険適応外の使用 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |

| がん治療ワーキンググループ使用欄 | |
|------------------|-------------|
| 登録番号 | CTCL-005 |
| 登録日・更新日 | 2023年12月26日 |
| 削除日 | |
| 出典 | アドセトリス添付文書 |
| 入力者 | 園部 あみ |

投与順に記入(抗がん剤のみ)

| | 薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名) | 規格 | 投与量算出式 | 投与経路 | 投与時間 | 施行日 |
|------|--|--------|-------------|--|------|------|
| | 希釈液 | | | | | |
| No.1 | ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え) (アドセトリス点滴静注用) | 50mg | 1.8mg/kg ** | <input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他() | 30分 | Day1 |
| | 生理食塩液 | 100mL* | | | | |

| | |
|------------|---|
| 1コースの期間 | 21 日 |
| 投与間隔の短縮規定 | <input type="checkbox"/> 短縮可能(日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能 |
| 計算後の投与量上限値 | 110% |
| 計算後の投与量下限値 | 50% |

| | |
|----------|---|
| 減量・中止基準 | <p>【ブレンツキシマブ ベドチンの減量・中止基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●好中球減少症 1,000/mm³ 以上 1,000/mm³ 未満 する。 ・同一用法・用量で、投与を継続する。 ・ベースライン又は1,000/mm³以上に回復するまで休薬する。 ●末梢神経障害 Grade 1(機能障害はなく、知覚障害、反射消失のみ) ・同一用法・用量で、投与を継続する。 Grade 2(機能障害はあるが、日常生活に支障はない)またはGrade3(日常生活に支障がある) ・ベースライン又はGrade1以下に回復するまで休薬する。回復した場合は、1.2mg/kgに減量して投与を再開する。 Grade 4(障害をきたす感覚ニューロパチー、生命を脅かす又は麻痺をきたす運動ニューロパチー) ・投与中止する。 |
| 前投薬 | なし |
| その他の注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則、16サイクルまでとする。 *希釈後の薬液濃度が0.4~1.2mg/mLとなる液量とする。 **体重が100kgを超える場合は100kgとして計算する。 ・プレオマイシンとの併用禁忌 |

| | |
|-----|-------|
| 記入者 | 園部 あみ |
| 確認者 | 竹内 正美 |