

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	XELOX
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	治癒切除不能進行再発結腸直腸がん
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	En-24
登録日・更新日	2009年10月21日
削除日	
出典	JCO2008;26:5910-5917 JCO2008;26:2006-2012
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	エルプラット注射用	50,100mg	130mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	2時間	Day1
	ブドウ糖液5%	250mL				
No.2	ゼローダ錠	300mg	1000mg/m <sup>2</sup> /回	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他( po )	食後30分以内	Day1(夕)~15(朝)
			2回/日			

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能( 2日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	減量基準 Grade3の血液毒性もしくはGrade2の非血液毒性を経験した場合次回の投与量を80%に減量 80%に減量後もGrade3の血液毒性もしくはGrade2の非血液毒性を経験した場合次回の投与量を初回投与量の50%に減量  中止基準 Grade4の非血液毒性
前投薬	グラニセトロン3mg デキサメタゾンNa8mg ファモチジン10mg
その他の注意事項	

記入者	安室 修
確認者	大山 優