

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	XELOX+Bev
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	治癒切除不能進行再発結腸直腸がん
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	En-25
登録日・更新日	2009年10月21日
削除日	
出典	JCO2008;26:5910-5917 JCO2008;26:2006-2012
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	アバスチン点滴静注用	100,400mg	7.5mg/kg	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	90分	Day1
	生理食塩液	100mL				
No.2	エルプラット注射用	50,100mg	130mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	2時間	Day1
	ブドウ糖液5%	250mL				
No.3	ゼローダ錠	300mg	1000mg/m ² /回	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(po)	食後30分以内	Day1(夕)~15(朝)
			2回/日			

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能(2日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	減量基準 Grade3の血液毒性もしくはGrade2の非血液毒性を経験した場合次回の投与量を80%に減量 80%に減量後もGrade3の血液毒性もしくはGrade2の非血液毒性を経験した場合次回の投与量を初回投与量の50%に減量 中止基準 Grade4の非血液毒性
前投薬	グラニセトロン3mg デキサメタゾンNa8mg ファモチジン10mg
その他の注意事項	脳転移を有する患者に禁忌 アバスチン点滴静注用の点滴時間:初回90分、2回目以降は忍容性に依じて60分、30分に短縮可能

記入者	安室 修
確認者	大山 優