

## がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	SOX ± Bev
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	大腸がん
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	En-39
登録日・更新日	2012年3月13日
削除日	
出典	
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	ティーエスワン	20,25mg	80mg/m <sup>2</sup> *	IV DIV IVHポート 側管 その他( 経口 )	分2(朝・夕)	Day1-14
	なし					
No.2	エルブラット	50,100mg	130mg/m <sup>2</sup>	IV DIV IVHポート 側管 その他( )	2時間	Day1
	ブドウ糖液5%	250mL				
No.3	アバステン	100,400mg	7.5mg/m <sup>2</sup>	IV DIV IVHポート 側管 その他( )	90分	Day1
	生理食塩液	100mL				

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	短縮可能( 1 日 ) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	<p>【ティーエスワン休業基準】 ANC&lt;1,000/mm<sup>3</sup> Plt&lt;7.5万/mm<sup>3</sup> Ccr&lt;60mL/min 感染を疑う38 以上の発熱 下痢、粘膜炎、口内炎 Grade2以上</p> <p>【アバステン中止基準】 血栓/塞栓症:Grade3以上 消化管穿孔:Grade1以上 出血:Grade3以上 高血圧:薬剤でコントロールできないGrade3以上 過敏症:Grade3以上</p> <p>【減量基準】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">初回量</td> <td style="text-align: center;">レベル-1</td> <td style="text-align: center;">レベル-2</td> </tr> <tr> <td>L-OHP</td> <td style="text-align: center;">130mg/m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center;">100mg/m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center;">85mg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td style="text-align: center;">80mg/day</td> <td style="text-align: center;">60mg/day</td> <td style="text-align: center;">50mg/day</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td style="text-align: center;">100mg/day</td> <td style="text-align: center;">80mg/day</td> <td style="text-align: center;">60mg/day</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td style="text-align: center;">120mg/day</td> <td style="text-align: center;">100mg/day</td> <td style="text-align: center;">80mg/day</td> </tr> </table> <p>以下のいずれかに該当するときL-OHP、TS-1ともに1レベル減量 WBC&lt;1,000/mm<sup>3</sup> ANC&lt;500/mm<sup>3</sup>もしくはday22にコース開始基準を満たさない Grade3以上の好中球好中球減少 Plt&lt;5万/mm<sup>3</sup></p> <p>以下のいずれかに該当するときL-OHPのみ1レベル減量 5万/mm<sup>3</sup> Plt&lt;7.5万/mm<sup>3</sup>もしくはday22にコース開始基準を満たさない</p> <p>Grade3以上の下痢のときTS-1のみ1レベル減量</p>		初回量	レベル-1	レベル-2	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	85mg/m <sup>2</sup>	TS-1	80mg/day	60mg/day	50mg/day	TS-1	100mg/day	80mg/day	60mg/day	TS-1	120mg/day	100mg/day	80mg/day
	初回量	レベル-1	レベル-2																		
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	85mg/m <sup>2</sup>																		
TS-1	80mg/day	60mg/day	50mg/day																		
TS-1	100mg/day	80mg/day	60mg/day																		
TS-1	120mg/day	100mg/day	80mg/day																		
前投薬	アロキシ0.75mg、ガスター20mg、クロールトリメトン10mg、デキサメタゾンNa																				
その他の注意事項	<p>アバステンは最大30分まで短縮可能</p> <p>*ティーエスワン投与量 体表面積 1.25m<sup>2</sup>未満 40mg/回 × 2/day 1.25m<sup>2</sup>以上 1.5m<sup>2</sup>未満 50mg/回 × 2/day 1.5m<sup>2</sup>以上 60mg/回 × 2/day</p>																				

記入者	五味 大輔
確認者	大山 優