

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	SIR ± BeV
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	大腸がん
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	En-40
登録日・更新日	2012年3月13日
削除日	
出典	
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート			投与時間	施行日
No.1	ティーエスワン	20,25mg	80mg/m ² *	IV	DIV	IVHポート 側管 その他(経口)	分2(朝・夕)	Day1-14
	なし							
No.2	イリリテカン	50,100mg	150mg/m ²	IV	DIV	IVHポート 側管 その他()	90分	Day1
	生理食塩液	500mL						
No.3	アバステン	100,400mg	7.5mg/m ²	IV	DIV	IVHポート 側管 その他()	90分	Day1
	生理食塩液	100mL						

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	短縮可能(1 日) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	<p>{ティーエスワン休薬基準} ANC<1,000/mm³ Plt<7.5万/mm³ Ccr<60mL/min 感染を疑う38 以上の発熱 下痢、粘膜炎、口内炎 Grade2以上 {アバステン中止基準} 血栓/塞栓症:Grade3以上 消化管穿孔:Grade1以上 出血:Grade3以上 高血圧:薬剤でコントロールできないGrade3以上 過敏症:Grade3以上 {減量基準}</p> <table border="1"> <tr> <td>初回量</td> <td>レベル-1</td> <td>レベル-2</td> </tr> <tr> <td>CPT-11</td> <td>150mg/m²</td> <td>125mg/m² 100mg/m²</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>80mg/day</td> <td>60mg/day 50mg/day</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>100mg/day</td> <td>80mg/day 60mg/day</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>120mg/day</td> <td>100mg/day 80mg/day</td> </tr> </table> <p>以下のいずれかに該当するときCPT-11、TS-1ともに1レベル減量 WBC<1,000/mm³ ANC<500/mm³ Plt<5万/mm³ AST 200IU/L ALT 200IU/L Grade3以上の下痢もしくは口内炎 Ccr<60mL/minのときTS-1のみ1レベル減量</p>	初回量	レベル-1	レベル-2	CPT-11	150mg/m ²	125mg/m ² 100mg/m ²	TS-1	80mg/day	60mg/day 50mg/day	TS-1	100mg/day	80mg/day 60mg/day	TS-1	120mg/day	100mg/day 80mg/day
初回量	レベル-1	レベル-2														
CPT-11	150mg/m ²	125mg/m ² 100mg/m ²														
TS-1	80mg/day	60mg/day 50mg/day														
TS-1	100mg/day	80mg/day 60mg/day														
TS-1	120mg/day	100mg/day 80mg/day														
前投薬	アロキシ0.75mg、デキサメタゾンNa															
その他の注意事項	<p>アバステンは最大30分まで短縮可能 *ティーエスワン投与量 体表面積 1.25m²未満 40mg/回 × 2/day 1.25m²以上 1.5m²未満 50mg/回 × 2/day 1.5m²以上 60mg/回 × 2/day</p>															

記入者	五味 大輔
確認者	大山 優