

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	IRIS
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	切除不能または再発大腸がん
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	En-45
登録日・更新日	2018年8月28日
削除日	
出典	Lancet Oncol 2010; 11: 853-60
入力者	宮川 慧子

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	イリノテカン	40mg、100mg	125mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	90分	Day1, 15
	生理食塩液	500mL				
No.2	TS-1	20mg、25mg	*	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(経口)	1日2回	Day1-14
	なし					

1コースの期間	28 日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能( 1 日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	<p>【開始基準】 WBC<math>\geq</math>3000/<math>\mu</math>L、ANC<math>\geq</math>1500/<math>\mu</math>L、Plt<math>\geq</math>10万/<math>\mu</math>L、AST<math>\leq</math>100IU/L、ALT<math>\leq</math>100IU/L、T-Bil<math>\leq</math>1.5mg/dL、Scr<math>\leq</math>1.2mg/dL</p> <p>【延期基準】 Grade1以上の下痢、Grade2以上の非血液学毒性</p> <p>【中止基準】 Grade4の血液毒性あるいはGrade3以上の非血液学毒性がある場合は、次回両剤とも1段階減量して再開する</p>
前投薬	5-HT3 blocker、デキサメタゾン
その他の注意事項	<p>切除不能または再発大腸がんの2次以降の治療に使用</p> <p>*TS-1 投与量(体表面積あたり) BSA&lt;1.25m<sup>2</sup> 40mg/回 1.25m<sup>2</sup><math>\leq</math>BSA&lt;1.5m<sup>2</sup> 50mg/回 1.5m<sup>2</sup>&lt;BSA 60mg/回</p>

記入者	宮川 慧子
確認者	大山 優