

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	スニチニブ(GIST)
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	GIST-002
登録日・更新日	2022年10月25日
削除日	
出典	スーテント添付文書(2019年9月改訂(第1版))
入力者	船木 麻美

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
No.1	スニチニブリンゴ酸塩 (スーテントカプセル)	12.5mg	50mg	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(経口)	1日1回	Day1-28

1コースの期間	42日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日)・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	-
計算後の投与量下限値	-

減量・中止基準	<p>・管理できない重篤の高血圧が認められた場合は休薬する。</p> <p>・減量して投与を継続する場合には、12.5mg(1減量レベル)ずつ減量すること。</p> <p>&lt;血液系&gt; Grade3: Grade2以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前と同一投与量 Grade4: Grade2以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前より1レベル減量</p> <p>&lt;非血液系(心臓系を除く)&gt; Grade3: Grade1以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前と同一投与量または1レベル減量 Grade4: Grade1以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前より1レベル減量</p> <p>&lt;心臓系(左室駆出率低下、心室性不整脈)&gt; Grade2: Grade1以下に回復するまで投与を中止 再開時は中止前より1レベル減量 Grade3: Grade1以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前より1レベル減量 Grade4: 投与を中止</p>
前投薬	なし
その他の注意事項	創傷治癒遅延の可能性があるため手術時は投与を中断することが望ましい

記入者	船木 麻美
確認者	宮地 康僚