

がん化学療法レジメン登録票

レジメン名	q2w ニボルマブ(ホジキンリンパ腫)
診療科名	血液・腫瘍内科
診療科責任者名	末永 孝生
適応がん種	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	HL-5
登録日・更新日	2017年2月28日・2020年10月27日更新
削除日	
出典	Lancet Oncol. 2016 ;17 1283-94 国内第Ⅱ相(ONO-4538-15)試験
入力者	伊勢崎 竜也

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	ニボルマブ(遺伝子組換え) (オプジーボ点滴静注)	20mg、240mg	240mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	30分以上	day1
	生理食塩液	100mL				

1コースの期間	14日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能(1 日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	【初回治療開始基準】 ANC \geq 750/ μ L Hb \geq 8.0g/dL Plt \geq 5万/ μ L T-Bil \leq 2.0mg/dL AST \leq 100IU/L ALT \leq 150IU/L 血清Cr \leq 1.5mg/dL又はクレアチニンクリアランス \geq 40ml/min
前投薬	なし
その他の注意事項	インラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を使用する。 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、本剤の点滴溶液中の安定性が確認されていない。 【免疫チェックポイント阻害薬を使用する際の注意事項】を参照

記入者	伊勢崎 竜也
確認者	竹内 正美