

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	【再発】ベバシズマブ
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	悪性神経膠腫
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	HN-026
登録日・更新日	2020年4月28日
削除日	
出典	アバステン適正使用ガイド
入力者	菅野 仁美

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	ベバシズマブ(遺伝子組換え) (アバステン点滴静注用)	100mg、400mg	10mg/kg	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	*1	Day1
	生理食塩液	100mL				

1コースの期間	14日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	<p>【休薬基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・好中球数<1500/μL ・血小板数<75,000/μL ・コントロール不良な高血圧(収縮期血圧>150mmHgまたは拡張期血圧>100mmHgまたは臨床症状のある高血圧)はコントロール可能になり、臨床症状が改善されるまで ・尿蛋白定性3+又は24時間蓄尿で蛋白量が2g/24h以下、又は尿蛋白/クレアチニン比が3.5以下に回復するまで休薬 ・その他非血液毒性に関しては投与開始前のレベル又はGrade1以下になるまで休薬 <p>【中止基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Grade3以上の出血(肺、CNSからの出血はGrade2以上) ・ネフローゼ症候群 ・Grade4の高血圧
前投薬	なし
その他の注意事項	<p>*1 忍容性に応じて90分→60分→30分と短縮可能</p> <p>アバステン点滴静注を使用する際には月1回、尿定性および尿蛋白/尿クレアチニン比を測定すること</p>

記入者	菅野 仁美
確認者	宮地 康僚