

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	セツキシマブ サロタロカンナトリウム
診療科名	耳鼻咽喉科・頭頸部外科
診療科責任者名	明石 健
適応がん種	切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	HN-031
登録日・更新日	2021年6月22日
削除日	
出典	アキラルックス適正使用ガイド
入力者	柴田 渉

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え) (アキラルックス点滴静注)	250mg	640mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	2時間以上かけて	Day1
	-	-	-			

1コースの期間	28日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日)・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	なし
前投薬	抗ヒスタミン薬 + 副腎皮質ホルモン剤
その他の注意事項	<p>【調製に関して】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本剤は希釈して使用しないこと。 他の薬剤との混注はしないこと。 点滴バッグとしてアリメバッグαを使用すること。 本剤は光に不安定なので、直接照明、直接日光、あるいは間接日光を避けて調製すること。 <p>【投与に関して】</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用すること。 点滴静注バッグ、インラインフィルター、チューブ等は、常に遮光カバーで被覆するとともに、本剤の投与を行う部屋の窓はカーテンやブラインド等で覆うこと。 <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> 点滴静注終了20～28時間後にレーザー光(BioBlade[®]レーザーシステム)を病巣部位に照射する。 完全奏効が得られない場合、4週間以上の間隔を空けて最大4回まで本剤を点滴静注及びレーザー光を病巣部位に照射することができる

記入者	柴田 渉
確認者	明石 健