

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	テモダール
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	悪性神経膠腫
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	HN-7
登録日・更新日	2010年1月28日
削除日	
出典	NEJM 2005;352:987
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

放射線併用コース(1コースのみ)						
	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	テモダールカプセル	20mg	75mg/m <sup>2</sup>	IV DIV IVHポート 側管 その他( p.o. )	1回/日	Day1 ~ 42
アジュバントコース(放射線併用コース終了後) 6コース実施						
	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.2	テモダールカプセル	20mg	150mg/m <sup>2</sup> (200mg/m <sup>2</sup> )	IV DIV IVHポート 側管 その他( p.o. )	1回/日	Day1 ~ 5

1コースの期間	70日(放射線併用コース) 28日(アジュバントコース)
投与間隔の短縮規定	短縮可能( 日 ) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	放射線併用中 休薬基準 ANC < 1,500/mm <sup>3</sup> or Plt < 10万/mm <sup>3</sup> or Grade2の非血液学的副作用 中止基準 ANC < 500mm/mm <sup>3</sup> or Plt < 1万/mm <sup>3</sup> or Grade3以上の非血液学的副作用  アジュバントコース 休薬基準 ANC < 1,500/mm <sup>3</sup> or Plt < 10万/mm <sup>3</sup>
前投薬	メトクロプラミド or 5-HT <sub>3</sub> 拮抗剤 放射線併用中はスルファメトキサゾール/トリメトプリムを経口投与する
その他の注意事項	照射線量 2Gy/day, 5 ~ 6days/week, 6weeks, total 60Gy アジュバントコースにおいて血液毒性が見られなかった場合、2コース目に200mg/m <sup>2</sup> に増量可能

記入者	安室 修
確認者	大山 優