

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	CyBorD
診療科名	血液腫瘍内科
診療科責任者名	末永 孝生
適応がん種	多発性骨髄腫
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	MM-008
登録日・更新日	2012年3月13日登録・2023年4月25日更新
削除日	
出典	Blood 2010;115:3416
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	ボルテゾミブ (ボルテゾミブ注射用)	3mg	1.3mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(皮下注)	-	Day1,8,15,22
	生理食塩液	20mL				
No.2	シクロホスファミド (エンドキサン錠)	50mg	300mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(経口)	1回/日	Day1,8,15,22
No.3	デキサメタゾン (レナデックス錠)	4mg	40mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(経口)	1回/日	Day1(-2),9(-10),17(-18)

1コースの期間	28日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能(1日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	<p>【ボルテゾミブ】 Grade 3以上の非血液毒性(末梢性ニューロパシー・神経障害性疼痛を除く)もしくはGrade 4の血液毒性に該当する副作用が発現した場合は、回復するまで休薬 副作用発現時の投与量:1.3mg/m² 減量の目安:1.0mg/m² 副作用発現時の投与量:1.0mg/m² 減量の目安:0.7mg/m² 副作用発現時の投与量:0.7mg/m² 減量の目安:投与中止 副作用が回復しない場合又は最低投与量(0.7mg/m²)でも再発する場合は投与中止を考慮する。 末梢性ニューロパシー又は神経障害性疼痛が発現した場合 疼痛を伴うGrade 1又はGrade 2(日常生活に支障をきたさない程度の機能障害) 1.3mg/m²の場合1.0mg/m²へ減量又は1.0mg/m²の場合0.7mg/m²へ減量 疼痛を伴うGrade 2又はGrade 3(日常生活に支障をきたす機能障害) 回復するまで休薬。症状が回復した場合は、0.7mg/m²に減量した上で週1回投与に変更 Grade 4(障害をきたす感覚性ニューロパシー又は生命を脅かす/麻痺に至る運動性ニューロパシー) 投与中止</p>
前投薬	なし
その他の注意事項	アシクロビルの予防投与の実施200~400mg/Day デキサメタゾンの投与量は年齢などを考慮し適宜減量する

記入者	安室 修
確認者	山倉 昌之