

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
 プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	Bev+CBDCA+PTX
診療科名	呼吸器内科
診療科責任者名	金子 教宏
適応がん種	扁平上皮がんを除く 局所進行もしくは転移性NSCLC 脳転移症例には禁忌
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	NSCLC-33
登録日・更新日	2010年1月28日
削除日	
出典	JCO 2004;22:2184
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート			投与時間	施行日
No.1	アバスタチン点滴静注用	100mg,400mg	15mg/kg	IV	DIV	IVHポート 側管 その他( )	90分	Day1
	生理食塩液	100mL						
No.2	タキソール	30mg,100mg	200mg/m <sup>2</sup>	IV	DIV	IVHポート 側管 その他( )	3時間	Day1
	生理食塩液	500mL						
No.3	カルボプラチン	150mg	AUC5-6	IV	DIV	IVHポート 側管 その他( )	1時間	Day1
	生理食塩液	250mL						

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	短縮可能( )日・短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	【延期】 WBC<4,000/mm <sup>3</sup> またはANC<2,000/mm <sup>3</sup> のとき 【減量】 発熱性好中球減少症、5日間以上続くGrade3以上のANC減少、Grade2以上の出血、Grade3以上の悪心嘔吐(制吐剤でコントロールできない場合)、(不整脈、低血圧、胸痛などの)心臓血管症状、神経障害(Grade2以上)、その他のGrade3,4の毒性
前投薬	IV:デキサメタゾン 20mg ファモチジン 20mg グラニセトロン 3mg PO:ジフェンヒドラミン 50mg (もしくはIV:マレイン酸クロルフェニラミン 10mg)
その他の注意事項	嗜血の既往のある患者に禁忌 脳転移を有する患者には原則禁忌 アバスタチン点滴静注用の点滴時間:初回90分、2回目以降は忍容性に応じて60分、30分に短縮可能

記入者	安室 修
確認者	三沢 昌史