

レジメン名	セリチニブ
診療科名	呼吸器内科
診療科責任者名	大槻 歩
適応がん種	ALK融合遺伝子陽性の切除不能な 進行・再発の非小細胞肺癌
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	NSCLC-061
登録日・更新日	2016年11月22日 2019年6月25日更新
削除日	
出典	ジカディア適正使用ガイド
入力者	川名 晶子

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	セリチニブ (ジカディアカプセル)	150mg	1日1回 450mg	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(p.o )	食後	連日

1コースの期間	設定なし
投与間隔の短縮規定	該当しない
計算後の投与量上限値	100%
計算後の投与量下限値	30%

減量・中止基準	【中止・減量基準】 別途記載
前投薬	なし
その他の注意事項	減量ステップ:中止減量基準参照 1日150mgで投与継続が困難な場合は、本剤は中止する。

記入者	川名 晶子
確認者	大槻 歩