

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	CDDP+VNR
診療科名	呼吸器内科
診療科責任者名	金子 教宏
適応がん種	NSCLC I B-ⅢA(N2症例)
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	NSCLC-1
登録日・更新日	2008年7月16日
削除日	
出典	N Engl J Med 2005;352:2589-2597 Ann Oncol 2007;18:317-323
入力者	

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	シスプラチン	10mg,50mg	60-80mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	2時間	Day1
	生理食塩液	500mL				
No.2	ナベルピン	40mg	25mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	10分以内	Day1、8
	生理食塩液	50mL				

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( 日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	シスプラチン BUN $\geq$ 25mg/dL クレアチニン $\geq$ 1.5mg/dLのとき投与不可  ナベルピン WBC $<$ 2,000/mm <sup>3</sup> のとき投与延期
前投薬	グラニセトロン3mg デキサメタゾン
その他の注意事項	シスプラチン投与前後にそれぞれ1,000~2,000mLの適当な輸液を4時間以上かけて投与

記入者	安室 修
確認者	三沢 昌史