

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	CDDP+DTX+concTRT
診療科名	呼吸器内科
診療科責任者名	金子 教宏
適応がん種	進行NSCLC*
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	NSCLC-21
登録日・更新日	2008年7月16日
削除日	
出典	
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	タキソテール	20mg,80mg	40mg/m^2	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	1時間	Day1、8、29、36
	生理食塩液	250mL				
No.2	シスプラチニ	10mg,50mg	40mg/m^2	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	2時間	Day1、8、29、36
	生理食塩液	500mL				

1コースの期間	日	記入者 安室 修  確認者 三沢 昌史
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( 日) · <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能	
計算後の投与量上限値	110%	
計算後の投与量下限値	50%	

減量・中止基準	シスプラチニ BUN $\geq$ 25mg/dL クレアチニン $\geq$ 1.5mg/dLのとき投与不可 タキソテール ANC<2,000/mm^3のとき投与延期
前投薬	グラニセトロン3mg デキサメタゾン
その他の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・*根治的放射線照射が可能な場合(StageⅢA-N2症例、StageⅢBの一部など)</li> <li>・PS 0~1かつ年齢70歳未満</li> <li>・癌性胸水・癌性心嚢水を認める例においては、全身化学療法前に局所療法(ドレナージ後に胸膜瘻着術・心膜瘻着術)を可能な限り実行する</li> <li>・脳転移症例においては、全脳照射あるいは定位脳照射を可能な限り実行する</li> <li>・シスプラチニ投与前後にそれぞれ1,000~2,000mLの適当な輸液を4時間以上かけて投与する</li> </ul>