

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です
 プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	weekly DC
診療科名	産婦人科
診療科責任者名	大塚 伊佐夫
適応がん種	卵巣がん
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ov-22
登録日・更新日	2010年1月28日
削除日	
出典	Am J Clin Oncol 2007;30:51-6 Gynecol Oncol.2007;105:358-64
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート					投与時間	施行日
No.1	カルボプラチン	50, 150, 450mg	AUC2	IV	DIV	IVHポート	側管	その他()	1時間	Day1, 8, 15
	生理食塩液									
No.2	タキソテール	20, 80mg	30mg/m ²	IV	DIV	IVHポート	側管	その他()	1時間	Day1, 8, 15
	生理食塩液									

1コースの期間	28日
投与間隔の短縮規定	短縮可能(日) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	【延期基準】 WBC<2,000/mm ³ ANC<1,000/mm ³ Hb<8.0g/dL Plt<5万/mm ³ T-Bil>2.0mg/dL AST>100IU/L ALT>100IU/L BUN>40mg/dL SCr>1.5/dL 上記以外でGrade3(CTCAEv3.0)以上の有害事象発現時
前投薬	グラニセトロン3mg+デキサメタゾンNa
その他の注意事項	6~8コース実施 DTXによる浮腫予防のため投与終了後からデキサメタゾン4mg/回を2回/日 計4回投与する 「Am J Clin Oncol 2007;30:51-6」はNSCLCの論文であるがPhase の忍容性試験であるため本レジメンの参考とした

記入者	安室 修
確認者	大塚 伊佐夫