

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	ジェムザール
診療科名	産婦人科
診療科責任者名	大塚 伊佐夫
適応がん種	卵巣がん
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ov-24
登録日・更新日	2011年4月25日
削除日	
出典	ジェムザール添付文書
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	ジェムザール	200mg,1g	1000mg/m ²	IV DIV IVHポート 側管 その他()	30分	Day1,8,15
	生理食塩液	100mL				

1コースの期間	28日
投与間隔の短縮規定	短縮可能(1 日) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	[中止・延期基準] WBC<2,000/mm ³ ANC<1,000/mm ³ Hb<8.0g/dL Plt<5万/mm ³ T-Bil>2.0mg/dL AST>100IU/L ALT>100IU/L BUN>40mg/dL SCr>1.5/dL 上記以外でGrade3(CTCAEv3.0)以上の有害事象発現時
前投薬	デキサメタゾンNa
その他の注意事項	がん化学療法に増悪した卵巣がんに適応する。 白金製剤を含む化学療法施行後の症例を対象とし、白金製剤に対する感受性を考慮してジェムザール以外の治療法を慎重に検討した上で、投与を開始する。 ・放射線との同時併用は避ける ・ジェムザールによる血管痛がある場合は5%ブドウ糖への変更が可能

記入者	安室 修
確認者	大塚 伊佐夫