

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	PLD+CBDCA
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	卵巣がん
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ov-27
登録日・更新日	2011年8月1日
削除日	
出典	JCO 2010;28:3323
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート			投与時間	施行日
No.1	カルボプラチン点滴静注液	50, 150, 450mg	AUC5	IV	DIV	IVHポート 側管 その他( )	1時間	Day1
	生理食塩液	250mL						
No.2	ドキシル注	20mg	30mg/m <sup>2</sup>	IV	DIV	IVHポート 側管 その他( )	1mg/min	Day1
	5%ブドウ糖注射液	250mL						

1コースの期間	28日
投与間隔の短縮規定	短縮可能( 1 日) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	【中止・延期基準】 WBC<2,000/mm <sup>3</sup> ANC<1,000/mm <sup>3</sup> Hb<8.0g/dL Plt<5万/mm <sup>3</sup> T-Bil>2.0mg/dL AST>100IU/L ALT>100IU/L BUN>40mg/dL SCr>1.5/dL 上記以外でGrade3(CTCAEv3.0)以上の有害事象発現時
前投薬	グラニセトロン3mg+デキサメタゾンNa
その他の注意事項	ドキシル投与の前後にライン内を5%ブドウ糖注射液でフラッシュする

記入者	安室 修
確認者	大山 優