

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	PTXq3w
診療科名	産婦人科
診療科責任者名	大塚 伊佐夫
適応がん種	卵巣がん 再発
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ov-3
登録日・更新日	2008年7月16日
削除日	
出典	タキソール添付文書
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	タキソール	30mg、100mg	175mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	3時間	Day1
	生理食塩液	500mL				

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( 日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	タキソール 投与前の臨床検査で白血球数が4,000/mm <sup>3</sup> 未満又は好中球数が2,000/mm <sup>3</sup> 未満であれば、骨髄機能が回復するまでは投与を延期すること。投与後、白血球数が1,000/mm <sup>3</sup> 未満となった場合には次回の投与量を減量すること。
前投薬	IV:デキサメタゾン 20mg ファモチジン 20mg PO:ジフェンヒドラミン 50mg
その他の注意事項	タキサン系薬剤による前治療がない場合

記入者	安室 修
確認者	大塚 伊佐夫