

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	weekly Ned
診療科名	産婦人科
診療科責任者名	大塚 伊佐夫
適応がん種	卵巣がん 再発
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ov-7
登録日・更新日	2008年7月16日
削除日	
出典	Kodama et al. Int J Gynecol Cancer 2007 Epub Yoshinaga et al. Gynecol Oncol 2007;104:36-40
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	アクブラ	10mg、100mg	30-35mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	3時間	Day1,8,15
	生理食塩液	500mL				

1コースの期間	28日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( 日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	Grade3の毒性出現時には投与延期 Grade4の毒性出現時には投与中止 WBC>3,000/mm <sup>3</sup> ANC>2,000/mm <sup>3</sup> Plt>10万/mm <sup>3</sup> 総ビリルビン<1.5mg/dl 血清クレアチニン<1.2mg/dl AST<66IU/L ALT<84IU/L
前投薬	グラニセトロン3mg デキサメタゾン
その他の注意事項	75歳以下の患者に適応 ECOG performance status 0 or 1

記入者	安室 修
確認者	大塚 伊佐夫