

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です  
 プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	CBDCA+VP-16
診療科名	呼吸器内科
診療科責任者名	大槻 歩
適応がん種	SCLC
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	SCLC-015
登録日・更新日	2019年2月26日更新
削除日	
出典	Ann Oncol 2001;12:1231-8
入力者	伊勢崎竜也

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名) 希釈液	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
No.1	カルボプラチン (カルボプラチン点滴静注液「サンド」) 生理食塩液	50mg,150mg,450mg 250mL	AUC5	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	60分	day1
No.2	エトポシド (エトポシド点滴静注液「サンド」) 生理食塩液	100mg 500mL	100mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	2時間	day1-3

1コースの期間	21-28日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( 日)・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	【中止・延期基準】 WBC<3,000/mm <sup>3</sup> またはPlt<10万/mm <sup>3</sup> のとき投与延期
前投薬	抗5-HT3制吐剤、デキサメタゾン、アプレピタント
その他の注意事項	・LD再発(relapse)症例,ED症例(1st line)PS 0~2 ・脳転移のない症例で化療後にgoodPR、CRIに入った症例はPCIを考慮する ・70歳以上 あるいは 水分負荷が不可能な場合

記入者	伊勢崎竜也
確認者	大槻 歩