

レジメン名	エリブリン(悪性軟部腫瘍)
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	悪性軟部腫瘍
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Sa-13
登録日・更新日	2016年8月23日
削除日	
出典	ハラヴェン適正使用ガイド
入力者	塚田 麻実

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	ハラヴェン静注	1mg	1.4mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	2~5分(全開)	Day1,8
	生理食塩液	50mL				

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能(1日)・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	<p>【延期基準】 ANC<1,000/mm³、Plt<75,000/mm³、Grade3以上の非血液毒性</p> <p>【減量基準】 前サイクルで以下が発現した場合 1.4mg/m² → 1.1mg/m² → 0.7mg/m² → 中止を考慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7日間を超えて継続する好中球減少(<500/mm³) ・発熱又は感染を伴う好中球減少(<1,000/mm³) ・血小板減少(<25,000/mm³) ・輸血要する血小板減少(<50,000/mm³) ・Grade3以上の非血液毒性 ・副作用などにより、2週目に休薬
前投薬	原則なし
その他の注意事項	

記入者	塚田 麻実
確認者	大山 優