

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	CBDCA+PTX
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	原発性不明がん
保険適応外の使用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	UPC-1
登録日・更新日	2009年1月14日
削除日	
出典	J Clin Oncol 2000;18:3101
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	カルボプラチン注	150mg	AUC6	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	30分	Day1
	生理食塩液	250mL				
No.2	タキソール注	30mg、100mg	200mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	3時間	Day1
	生理食塩液	500mL				
No.3	G-CSF		50~100 μg	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(S.C.		Day5-12

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	<p>【投与延期】 ANC<1500/mm³ Plt<10万/mm³</p> <p>【減量基準】 Grade2の血液学的毒性または下痢発現時⇒PTX:180mg/m² CBDCA:AUC5 Grade3,4の血液学的毒性または下痢発現時⇒PTX:150mg/m² CBDCA:AUC4</p> <p>【中止基準】 Grade2以上の臓器毒性発現時は治療中止を検討する</p>
前投薬	CBDCA開始10分前 デキサメタゾンNa16mg,ジフェンヒドラミン50mg,ファモチジン20mg,グラニセトロン3mg
その他の注意事項	最大6コースまで可能(慢性疾患を合併している患者は6コースまで)

記入者	安室 修
確認者	大山 優