

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

| | |
|----------|-------|
| レジメン名 | TIP |
| 診療科名 | 泌尿器科 |
| 診療科責任者名 | 太田 智則 |
| 適応がん種 | 精巣腫瘍 |
| 保険適応外の使用 | 有 無 |

| がん治療ワーキンググループ使用欄 | |
|------------------|-------------------------------|
| 登録番号 | Ur-17 |
| 登録日・更新日 | 2009年4月15日 |
| 削除日 | |
| 出典 | J Clin Oncol 2005;23:6549-55. |
| 入力者 | 安室 修 |

投与順に記入(抗がん剤のみ)

| | 薬剤名 | 規格 | 投与量算出式 | ルート | | | 投与時間 | 施行日 |
|------|----------|----------|----------------------|-----|-----|---------------------|-------|------------|
| | | | | IV | DIV | IVHポート 側管 その他() | | |
| No.1 | タキソール注 | 30,100mg | 250mg/m ² | IV | DIV | IVHポート 側管 その他() | 24時間 | Day1 |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | |
| No.2 | 注射用イホマイド | 1g | 1.5g/m ² | IV | DIV | IVHポート 側管 その他() | 1時間以上 | Day2 ~ 5 |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | |
| No.3 | シスプラチン注 | 10,50mg | 25mg/m ² | IV | DIV | IVHポート 側管 その他() | 30分以上 | Day2 ~ 5 |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | |
| No.4 | G-CSF | | 5 μg/kg | IV | DIV | IVHポート 側管 その他(SC) | | Day7 ~ 18* |

| | |
|------------|------------------|
| 1コースの期間 | 21日 |
| 投与間隔の短縮規定 | 短縮可能(日) ・ 短縮不可能 |
| 計算後の投与量上限値 | 110% |
| 計算後の投与量下限値 | 50% |

| | |
|----------|--|
| 減量・中止基準 | 減量投与は行わない ANC < 450/ μLかつPlt < 7.5万/ μLのとき投与延期 |
| 前投薬 | デキサメタゾンNa20mg(PO) : パクリタキセル投与14時間前と7時間前 ジフェンヒドラミン50mg, ファモチジン20mg(IV) : パクリタキセル投与1時間前 |
| その他の注意事項 | メスナ 500mg/m ² /回 をイホマイド投与前および4、8時間後に投与する(計1日3回5日間) Day2 ~ 5はハイドレーションを3L/日以上行う *WBC 10,000/ μL(2日間)となったときはG-CSFの投与中止 |

| | |
|-----|-------|
| 記入者 | 安室 修 |
| 確認者 | 太田 智則 |