

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	トーリセル
診療科名	泌尿器科
診療科責任者名	太田 智則
適応がん種	根治切除不能又は転移性の腎細胞がん
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ur-26
登録日・更新日	2011年1月19日
削除日	
出典	トーリセル添付文書
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	トーリセル	25mg	25mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	30分	Day1
	生理食塩液	250mL				

1コースの期間	7日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能( 1 日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	<p><b>【1コース目投与開始基準】</b> PS( ECOG ): 0~2 ANC <math>\geq 1,500/\text{mm}^3</math> Hb <math>\geq 8\text{g/dL}</math> Plt <math>\geq 10\text{万}/\text{mm}^3</math> Scr <math>\leq 1.5\text{mg/dL}</math> BUN <math>\leq 35\text{mg/dL}</math> T-Bil <math>\leq 1.5\text{mg/dL}</math> AST <math>\leq 120\text{IU}</math>(肝転移のとき <math>\leq 200\text{IU}</math>) ALT <math>\leq 105\text{IU}</math>(肝転移のとき <math>\leq 175\text{IU}</math>) 総コレステロール <math>\leq 350\text{mg/dL}</math> トリグリセリド <math>\leq 400\text{mg/dL}</math> HbA1C <math>&lt; 10\%</math> 空腹時血糖 <math>\geq 165\text{mg/dL}</math></p> <p><b>【休薬基準 2コース目以降】</b> Grade 3,4(間質性肺炎を除く)の副作用発現時 ANC <math>\geq 1,000/\text{mm}^3</math> Plt <math>\geq 7.5\text{万}/\text{mm}^3</math> Grade 2以下までに回復するまで休薬する</p> <p><b>【減量基準 2コース目以降】</b> 休薬基準に該当した場合、5mg/body減量して投与を再開する</p> <p>1段階減量: 20mg/body 2段階減量: 15mg/body 3段階減量: 10mg/body (10mg/body未満への減量は行わない)</p>
前投薬	クロルフェニラミン
その他の注意事項	投与時に5 $\mu\text{m}$ 以下のインラインフィルターを使用する

記入者	安室 修
確認者	太田 智則