

lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenström's macroglobulinemia

登録番号	レジメン名	一般名	商品名	投与量	ルート	施行日	1コースの期間
LPL-1	BD+Rit 1サイクル目	ボルテゾミブ	ベルケイド注射用	1.3mg/m ²	sc	day1、4、8、11	21日
	BD+Rit 2,5サイクル目	リツキシマブ	リツキサン注、リツキシマブBS	375mg/m ²	DIV		
		ボルテゾミブ	ベルケイド注射用	1.3mg/m ²	sc	day1、8、15、22	35日
BD+Rit 3,4サイクル目	デキサメタゾン	デキサート注	40mg/body	DIV			
LPL-2	BD+Rit 変法 1サイクル目	ボルテゾミブ	ベルケイド注射用	1.3mg/m ²	sc	day1、4、8、11	21日
		リツキシマブ	リツキサン注、リツキシマブBS	375mg/m ²	DIV	day1	
	BD+Rit 変法 2サイクル目	ボルテゾミブ	ベルケイド注射用	1.3mg/m ²	sc	day1、8、15、22	35日
	デキサメタゾン	デキサート注	40mg/body	DIV	day1、8、15、22		
LPL-3	CRD	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	デキサート注射液	20mg/body	DIV	day1	21日
		リツキシマブ	リツキサン注、リツキシマブBS	375mg/m ²	DIV	day1	
		シクロホスファミド	エンドキサン錠	200mg/m ²	po	day1~5	
LPL-4	チラブルチニブ (WM/LPL)	チラブルチニブ塩酸塩	ベレキシブル錠	480mg/body	po	連日	