

自家移植前レジメン一覧

同種移植前レジメン

登録番号	レジメン名	一般名	商品名	投与量	ルート	施行日	1コースの期間
Allo-1	Flu+Bu2+TBI	フルダラビン	フルダラ静注用	30mg/m ²	DIV	day-8 ~ day-3	設定なし
		ブスルファン	ブスルフェクス点滴静注用	3.2mg/kg	DIV	day-6、-5	
Allo-2	CY+BU4	シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン	60mg/kg/day	DIV, CV	day-3 ~ day-2	設定なし
		ブスルファン	ブスルフェクス点滴静注用	3.2mg/kg	CV	day-7 ~ -4	
Allo-3	CY+TBI	エンドキサン	注射用エンドキサン	60mg/kg/day	DIV, CV	day-3 ~ day-2	設定なし
Allo-4	Flu+Bu2+TBI with post-transplant Cy 変法	フルダラビン	フルダラ静注用	30mg/m ²	DIV, CV	day-6 ~ day-2	設定なし
		ブスルファン	ブスルフェクス点滴静注用	3.2mg/kg	CV	day-4 ~ day-3	
		シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン	50mg/kg	DIV, CV	day3, day4	
Allo-5	Flu+Bu4+TBI with post-transplant Cy	フルダラビン	フルダラ静注用	30mg/m ²	DIV, CV	day-6 ~ day-2	設定なし
		ブスルファン	ブスルフェクス点滴静注用	3.2mg/kg	CV	day-6 ~ day-3	
		シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン	50mg/kg	DIV, CV	day3, day4	
Allo-6	short-term methotrexate (急性GVHD予防)	メトレキサート	注射用メトレキサート	10mg/m ²	DIV	day1	設定なし
		メトレキサート	注射用メトレキサート	7mg/m ²	DIV	day3, day6、(day11)	
Allo-7	VP-16+CY+TBI	エトポシド	エトポシド点滴静注液	15mg/kg/day	CV	Day -7~-6	設定なし
		シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン	60mg/kg/day		Day -5~-4	
Allo-8	FLU+MEL	フルダラビン	フルダラ静注用	25 mg/m ²	DIV, CV	day -7 ~ -3	設定なし
		メルファラン	アルケラン静注用	140 mg/m ²		day -2	
Allo-9	FLU+MEL分割	フルダラビン	フルダラ静注用	25 mg/m ²	DIV, CV	day -6 ~ -2	設定なし
		メルファラン	アルケラン静注用	50 - 70 mg/m ²		day -3 ~ -2	
Allo-10	Flu+Cy+TBI	フルダラビン	フルダラ静注用	30mg/m ²	DIV, CV	day-6 ~ day-2	設定なし
		シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン	14.5 mg/kg		day-6 ~ day-5	
		シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン	50 mg/kg		day3, day4	
Allo-11	Ara+CY+TBI	シクロホスファミド水和物	注射用エンドキサン	60mg/kg/day	DIV, CV	day-5 ~ day-4	設定なし
		シタラビン	シタラビン点滴静注液	2g/m ² /回 × 2回		day-6	
		シタラビン	シタラビン点滴静注液	2g/m ² /回 × 1回		day-5 ~ day-4	
Allo-12	Flu+BU+CY with post-transplant CY	フルダラビンリン酸エステル	フルダラ静注用	25 mg/m ²	DIV, CV	day -6 ~ -2	設定なし
		ブスルファン	ブスルフェクス点滴静注用	3.2mg/kg		day -7 ~ -4	
		シクロホスファミド水和物	エンドキサン注射用	14.5 mg/kg		day-3, day-2	
		シクロホスファミド水和物	エンドキサン注射用	50 mg/kg		day3, day4	

自家移植前レジメン一覧

Allo-13	Flu+BU4+TBI	フルダラビンリン酸エステル ブスルファン	フルダラ静注用 ブスルフェクス点滴静注用	30mg/m2 3.2mg/kg	DIV, CV	day -8 ~ -3 day -6 ~ -3	設定なし
Allo-14	FLU+CY+ATG with post-transplant CY	フルダラビンリン酸エステル シクロホスファミド水和物 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	フルダラ静注用 エンドキサン注射用 サイモグロブリン点滴静注用	30 mg/m2 14.5 mg/kg 2.5 mg/kg	DIV, CV	day -6 ~ -2 day -6 ~ -5 day -4 ~ -2 または day -8 ~ -6 day3, day4	設定なし
Allo-15	1 day salvage regimen for graft failure	フルダラビンリン酸エステル シクロホスファミド水和物	フルダラ静注用 注射用エンドキサン	30mg/m2 2g/m2	DIV, CV CV	day -1	設定なし
Allo-16	High-dose AraC+CY+TBI for cord blood	シタラビン シクロホスファミド水和物	シタラビン点滴静注液 注射用エンドン	2 or 3g/m2/dose × 2回 60mg/kg	DIV, CV DIV, CV	day-5 ~ -4 day-3 ~ -2	設定なし
Allo-17	Ful + TBI with post-transplant Cy	フルダラビンリン酸エステル シクロホスファミド水和物	フルダラ静注用 エンドキサン注射用	30mg/m2 50mg/kg	DIV, CV DIV, CV	day -6 ~ -4 day3, day4	設定なし
Allo-18	CY+TBI with アレムツズマブ	シクロホスファミド水和物 アレムツズマブ	エンドキサン注射用 マブキャンパス点滴静注	60mg/kg 0.16mg/kg	DIV, CV DIV, CV	day-3 ~ day-2 day-8 ~ day-3	設定なし
Allo-19	Flu+Bu+TBI with アレムツズマブ	フルダラビンリン酸エステル ブスルファン アレムツズマブ	フルダラ静注用) ブスルフェクス点滴静注 マブキャンパス点滴静注	30mg/m2 3.2mg/kg 0.16mg/kg	DIV, CV CV DIV, CV	day-8 ~ day-3 day-6 ~ day-5 day-8 ~ day-3	設定なし
Allo-20	Flu+CY+TBI with アレムツズマブ	フルダラビンリン酸エステル シクロホスファミド水和物 アレムツズマブ	フルダラ静注用) エンドキサン注射用 マブキャンパス点滴静注	30mg/m2 25mg/kg 0.16mg/kg	DIV, CV DIV, CV DIV, CV	day-6 ~ day-3 day-6 ~ day-3 day-10 ~ day-5	設定なし